

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
12 NF

n° XXII

- 6 JUILLET 1962 -

AVERTISSEMENTS

MILDIOU

POMMES DE TERRE

Les conditions climatiques ne sont pas encore réunies pour que l'on puisse craindre une invasion généralisée. Ce n'est qu'après la prochaine période pluvieuse que l'on observera les premières taches en plein champ.

Mais, cette première apparition est un risque que l'on ne peut prendre dans les cultures placées en situation favorable au champignon surtout si des pluies abondantes sont à craindre à la mi-juillet (prévisions de la Météorologie Nationale).

En conséquence :

- Dans les cultures irriguées ou arrosées.
- Dans les cultures qui couvrent entièrement le sol et surtout celles qui sont placées dans des fonds abrités ou en vallée (Vallée de la Seine, de la Somme, de l'Authie, de la Canche, de la Lys, de la Deule, de la Scarpe...)
- Dans les cultures les plus avancées de la zone littorale.

Il est prudent d'effectuer un 1er traitement du 8 au 10 Juillet.

Remarques : Bien entendu, si le temps, au contraire, devient beau et sec, reculer l'opération jusqu'à l'approche des prochaines pluies.

- Les risques semblent particulièrement minimes dans l'Artois et les Flandres.
- Ne pas oublier d'ajouter si besoin est un insecticide pour lutter contre les doryphores.
- Compte tenu de la végétation, il est préférable d'utiliser actuellement un produit organique de synthèse plutôt qu'un produit cuprique.
- Le traitement semble inutile pour les cultures qui doivent être arrachées avant le 1er août (il sera remplacé si nécessaire par un brûlage de fanes à la fin-juillet).

PUCERONS

BETTERAVES

Sauf exception (cultures très tardives) les traitements semblent maintenant sans intérêt.

CERCOSPORIOSE

Sauf changement de temps important, aucun traitement ne semble justifié cette année.

INFORMATIONS

CARPOCAPSE DES FRUITS A PEPINS

CULTURES FRUITIERES

Dans les jardins et secteurs très chauds, traités avant le 1er Juillet, il sera prudent de renouveler l'opération vers le 15 Juillet. Dans les autres cultures, attendre un avis ultérieur.

OIDIUM

Attendre que le temps devienne plus chaud pour effectuer le traitement.

TEIGNE DU POIREAU

CULTURES MARAICHIERES

Un 1er traitement a du être effectué dans les premiers jours de Juillet. Un 2ème traitement au Parathion est nécessaire à la mi-juillet.

Le Contrôleur : R. DIVOUX

L'Inspecteur : P. COUTURIER